



Łomża, dn.11 sierpnia 2022 r.

URZĄD GMINY PIĄTNICA - wplynelo:

INSPEKCJA WETERYNARYJNA

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII

W ŁOMŻY

Leszek Wojewoda

**Urząd Gminy Piątnica
Piątnica ul. Stawiskowska 53
18-421 Piątnica Poduchowna**

Nasz znak: PIW - Z.511.14.21.2022

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łomży, w związku z zagrożeniem wystąpienia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej nowych ognisk afrykańskiego pomoru świń, przesyła w załączeniu ulotkę informacyjną na temat tej choroby, ulotkę dotyczącą postępowania przy znalezieniu padłego dzika oraz ulotkę informującą o konieczności i sposobie zgłaszania padłych sztuk świń, z prośbą o rozpowszechnienie w sposób zwyczajowo przyjęty.

**POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII
w Łomży**

z up.

**lek. wet. Marek Piotr Rutkowski
Starszy Inspektor Weterynaryjny**

Załączniki:

1. Ulotka informacyjna mycie i dezynfekcja.
2. Ulotka – znalezienie padłego dzika.
3. Ulotka – zgłaszanie padłych sztuk świń.

Otrzymują:

1. Adresat;
2. A/a



Powiatowy Inspektorat Weterynarii ul. Nowogrodzka 160, 18-400 Łomża
tel.: (86) 216-34-54, fax: (86) 216-34-54 wew. 44, e-mail: sekretariat@piw.lomza.pl

Objawy ASF i zgłoszenie podejrzenia

Jak rozpoznać afrykański pomór świń?

Objawy afrykańskiego pomoru świń mogą być niespecyficzne, podobne do innych chorób lub zatruc, mogą być różne w różnych stadach. Następujące objawy zawsze powinny zaniepokoić hodowcę:

- nagłe padnięcia świń - ASF w stadzie świń może niekiedy objawić się jedynie nagłymi padnięciami, bez innych objawów towarzyszących;
- wzrost wewnętrznej ciepłoty ciała (do 40,5-42°C), któremu mogą nie towarzyszyć inne symptomy (gorączkujące świnie mają czasem zachowany apetyt, poruszają się na ogół normalnie);
- inne objawy kliniczne, które mogą dołączyć do gorączki:
 - sinica skóry uszu, brzucha i boków ciała,
 - drobne, lecz liczne wybroczyny w skórze,
 - zaczerwienienie skóry widoczne zwłaszcza na końcach uszu, ogona i kończynach,
 - duszność,
 - pienisty wypływ z nosa,
 - wypływ z worka spojówkowego,
 - biegunka - często z domieszką krwi,
 - wymioty,
 - niedowład zadu,
 - objawy nerwowe w postaci podniecenia, drgawek mięśni i skurczów kloniczno-tonicznych,
 - ronienia u prośnych macior;
- niekiedy gorączce mogą towarzyszyć posmutnienie, utrata apetytu, szybkie i trudne oddychanie oraz zaleganie wydaliny z nosa i oczu, wymioty, zaparcia, krwista biegunka, przed śmiercią może nastąpić śpiączka, która pojawia się jeden do siedmiu dni po wystąpieniu pierwszych objawów klinicznych.

Podejrzewasz wystąpienie afrykańskiego pomoru świń?

Świnie zakażone wirusem afrykańskiego pomoru świń często wykazują objawy chorobowe podobne do objawów innych chorób (gorączka, wybroczyny, apatia, poronienia, padnięcia bez innych wyraźnych objawów) - dlatego w przypadku najmniejszego podejrzenia lub nawet domniemania możliwości wystąpienia ASF w stadzie, przede wszystkim na obszarach na których choroba występuje lub w sąsiedztwie tych obszarów, należy zgłosić podejrzenie ASF do właściwego powiatowego lekarza weterynarii celem umożliwienia pobrania próbek w kierunku wykluczenia ASF. Zgłoszenie należy przekazać bezpośrednio albo za pośrednictwem lekarza weterynarii opiekującego się gospodarstwem lub właściwego miejscowo organu samorządu terytorialnego (wójta, burmistrza).

W przypadku stwierdzenia padnięć trzody chlewnej w gospodarstwach zlokalizowanych w województwach podlaskim, lubelskim oraz mazowieckim, właściciele zwierząt powinni **natychmiast** poinformować o tym fakcie właściwego powiatowego lekarza weterynarii.

Zgłoszenie podejrzenia wystąpienia ASF, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt jest obowiązkiem, którego niedopełnienie stanowi wykroczenie.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łomży

**INFORMUJE O OBOWIĄZKU NIEZWŁOCZNEGO
ZGŁASZANIA WSZYSTKICH PADŁYCH SZTUK ŚWIŃ W
GOSPODARSTWACH**

- Zgłoszenia należy dokonać niezwłocznie po stwierdzeniu upadku, przed przekazaniem zwłok do zakładu utylizacyjnego;
- W przypadku stwierdzenia upadku w sobotę lub w niedzielę (lub inny dzień ustawowo wolny od pracy) należy odpowiednio zabezpieczyć zwłoki do czasu pobrania urzędowych prób;
- Od padłych sztuk świń pobierane są próby przez urzędowego lekarza weterynarii (narządy wewnętrzne – śledziona, nerka i tkanka płucna) w celu przekazania do badania w kierunku ASF;
- Wyniki powyższego badania są niezbędne do uzyskania pozwolenia Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łomży na przemieszczenie świń do rzeźni/ innego gospodarstwa lub zakładu;
- Zgłoszenia należy przekazywać osobiście w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Łomży, ul. Nowogrodzka 160, 18-400 Łomża lub telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30.

Telefon: 86 216 34 54




SZANOWNI PAŃSTWO, HODOWCY ZWIERZĄT GOSPODARSKICH

W związku z realnym zagrożeniem wystąpieniem kolejnych ognisk
AFRYKAŃSKIEGO POMORU ŚWIŃ (ASF) w kraju
Główny Lekarz Weterynarii przypomina o konieczności bezwzględного przestrzegania
ZASAD BIOASEKURACJI
w gospodarstwach utrzymujących trzodę chlewną, w tym o konieczności:

I. PRAWIDŁOWEGO CZYSZCZENIA I DEZYNFEKOWANIA POJAZDÓW DO PRZEWOZU ZWIERZĄT


(czyszczenie na sucho, mycie detergentem i płukanie wysokociśnieniowe, dezynfekcja powierzchni
zewnątrznych pojazdów, dezynfekcja kabiny)



II. CZYSZCZENIA I DEZYNFEKЦИИ OBUWIA



III. CZYSZCZENIA I DEZYNFEKЦИИ POWIERZCHNI WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH W BUDYNKACH GOSPODARSTWA ROLNEGO POPRZECZ:



1. Przygotowanie budynku inwentarskiego do mycia i dezynfekcji.

(wyprowadzenie zwierząt z obiektu, usunięcie ruchomego wyposażenia, „czyszczenie na sucho” - usunięcie ściółki, odchodów, pozostałości paszy, pajęczyn i kurzu także z trudno dostępnych miejsc takich jak: szczeliny przy oknach, wentylacji, spodnie elementy karmideł i poideł)

2. Mycie preparatem myjącym.

(namaczanie powierzchni zimną wodą przed zastosowaniem detergentów do mycia, pianowanie lub natrysk detergentem, usuwanie brudu strumieniem wody pod ciśnieniem)

3. Dezynfekcja właściwa.

(powinna być przeprowadzana na suchej powierzchni, z uwagi na możliwość zmniejszenia stężenia preparatu, a tym samym zmniejszenia skuteczności działania stosowanego środka w przypadku dezynfekcji mokrej powierzchni).

Wybierając środek do dezynfekcji należy zwrócić uwagę na:

1. Spektrum działania na drobnoustroje: produkt powinien wykazywać działanie wirusobójcze;
2. Zakres temperatur - środek dezynfekcyjny powinien być skuteczny zarówno w wysokiej, jak i niskiej temperaturze w budynku;
3. Bezpieczeństwo działania środka dezynfekującego: produkt powinien być biodegradowalny, nie wymagający spłukiwania, nie powinien korodować z elementami wyposażenia;
4. Zakres stosowania: produkt powinien służyć do dezynfekcji budynków, wyposażenia, ziemi wokół budynku, samochodów, obuwia, mat dezynfekcyjnych i basenów przejazdowych.

Dezynfekcję obiektów inwentarskich należy przeprowadzać w systemie pomieszczenie puste-pełne oraz dbać o codzienne rutynowe działania jak dezynfekcja rąk, obuwia, pojazdów itd.

W przypadku konieczności zachowania szczególnych środków ostrożności przy stosowaniu produktu biobójczego, w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób je stosujących, zwierząt przybywających w pomieszczeniach, w których produkty stosowano a także środowiska (wody, gleby) właściwym jest nawiązanie kontaktu z profesjonalną firmą prowadzącą dezynfekcję.

**WYKAZ PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH ZNAJDUJE SIĘ NA STRONIE
URZĘDU REJESTRACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH, WYROBÓW MEDYCZNYCH I
PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH**

ORAZ

**W BIULETYNIE INFORMACJI PUBLICZNEJ POD ADRESEM:
<http://bip.urpl.gov.pl/pl/biuletyny-i-wykazy/produkty-biob%c3%b3jczce>.**

**PRODUKTY BIOBÓJCZE PRZEZNACZONE DO STOSOWANIA
W HIGIENIE WETERYNARYJNEJ
NALEŻĄ DO
GRUPY PRODUKTOWEJ PT3.**

Każdorazowo przed dokonaniem wyboru produktu biobójczego do celów dezynfekcyjnych należy upewnić się, że dany preparat wykazuje działanie wirusobójcze. Informacja ta zawarta jest w ulotce produktu biobójczego lub w materiałach informacyjnych towarzyszących danemu produktowi.

Produkty biobójcze należy stosować ściśle według wskazań producenta.



INSPEKCJA
WETERYNARYJNA

**NIE
dla ASF**
w naszych
chlewniach!

Znalazłeś martwego dzika ZADZWOŃ!

JAK POSTĘPOWAĆ W PRZYPADKU ZNALEZIENIA PADŁEGO DZIKA?

1

• **ZNALAZŁEŚ MARTWEGO DZIKA – ZGŁOŚ** ten fakt do właściwego miejscowo Powiatowego Lekarza Weterynarii, komisariatu policji, wójta gminy: podając miejsce znalezienia zwłok.

2

• **OZNACZ** miejsce znalezienia zwłok dzika w celu ułatwienia ich odnalezienia przez właściwe służby.

3

• **NIE DOTYKAJ** zwłok dzika i pozostaw je w miejscu znalezienia.

W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM ASF*

• W lesie nie wolno pozostawiać żadnych odpadków żywnościowych.

• Osoba, która znalazła padłego dzika, a tym samym mogła mieć kontakt z wirusem ASF, powinna zastosować środki higieny niezbędne do ograniczenia ryzyka szerzenia się ASF, w tym odkażanie rąk i obuwia, pranie odzieży, a ponadto przez **72 godziny** po tym fakcie, nie powinna wchodzić do miejsc, w których utrzymywane są świnię.




Ludzie **NIE ZARAŻAJĄ SIĘ** wirusem *AFRYKAŃSKIEGO POMORU ŚWIŃ. Występowanie ASF wśród dzików stanowi jednak bardzo poważne zagrożenie dla trzody chlewnej. **KRAJ, W KTÓRYM WYSTĄPI ASF NARAŻONY JEST NA BARDZO DUŻE STRATY EKONOMICZNE!**

POWIATOWY
INSPEKTORAT
WETERYNARII W
ŁOMŻY
86 2163454


ASF

AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ

Zasady, których należy przestrzegać w celu
ochrony gospodarstwa przed wirusem:




DO POMIESZCZEŃ Z TRZODĄ MOŻE
WCHODZIĆ TYLKO OSOBA SPRAWUJĄCA
OPIEKĘ NAD ZWIERZĘTAMI.



UTRZYMUJ POMIESZCZENIA
W CZYSTOŚCI I PAMIĘTAJ
O DEZYNFEKCIJ.



NIE KARM ZWIERZĄT ODPADAMI
KUCHENNYMI.



PRZED WEJŚCIEM DO BUDYNKÓW
ROZKŁADAJ MATY NASĄCZONE
ŚRODKIEM DEZYNFEKUJĄCYM.



ZABEZPIECZ ZWIERZĘTA PRZED
BEZPOŚREDNIM KONTAKTEM
Z DZIKAMI.



DO PRACY ZE ZWIERZĘTAMI
UŻYWAJ ODDZIELNEGO STROJU
I POZOSTAWIAJ GO W CHLEWNI.

**OBSERWUJ STAN ZDROWIA ZWIERZĄT! O WSZELKICH NIEPOKOJĄCYCH
OBJAWACH NATYCHMIAST POWIADOM LEKARZA WETERYNARII.**

Zwierzęta i gospodarstwo muszą być zarejestrowane w bazie ARiMR.